

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°134
du 29 Novembre

ARBRES FRUITIERS	=	Fusicoccum et coryneum
FRAISIERS	=	Nettoyage d'hiver
SALADES	=	Attention au botrytis

ARBRES FRUITIERS

Rappel -> le **fusicoccum** sur pêcher se signale par une tache brunâtre déprimée autour du point d'insertion du bourgeon. L'extrémité du rameau se dessèche. On observe également sur les zones nécrosées des ponctuations noires (pycnides)

-> Vous pouvez effectuer un dernier traitement chute des feuilles avec des produits à base de benomyl, carbendazyme, thiophanate methyl

-> Ne pas confondre avec le **coryneum** qui se traduit par de nombreuses petites taches rougeâtres sur les feuilles. Après les taches apparaissent des perforations. Sur les rameaux on observe des nécroses et en hiver des petits chancres entraînant des exsudations de gomme.

-> Vous pouvez effectuer un dernier traitement chute des feuilles avec du cuivre.

FRAISIERS

C'est le moment d'effectuer un nettoyage des vieilles feuilles. Vous ferez suivre cette opération d'une pulvérisation de bouillie bordelaise à 1 %.

.../...

P 58

SALADES

Dès que la température est élevée pendant la journée et l'hygrométrie nocturne importante, des risques de développement de botrytis sont à craindre. Dès le premier symptôme, vous utiliserez les matières actives suivantes:

Matière active	Dose en g/are
Folpel	15
Iprodione	7,5
Procymidone (1)	7,5
Vinchlozoline (1)	7,5

(1) Ne pas utiliser sur jeunes plantes, ni en association avec un insecticide = risque de phytotoxicité .

**** Bien respecter les doses****

:	:	
:	arrêter tout traitement au stade 15 à	:
:	17 feuilles (compter toutes les feuilles	:
:	à l'exception de celles du coeur de	:
:	moins de 3 cm ²)	:
:	:	: